PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO URBANO DELL'EX OSPEDALE GALATEO

REPERTORIO BOTANICO ARBUSTIVO

Lecce, ottobre 2017

Rosario Centonze – dottore agronomo

Arbutus unedo *L.* – Corbezzolo

Specie dal portamento variabile da cespuglio ad albero, sempreverde, con chioma densa, tondeggiante, irregolare, di colore verde carico, con il tronco corto, eretto, sinuoso e densamente ramificato, i giovani rametti sono ocraceo-rossastri e tomentosi, la corteccia è sottile bruno-rossastra e rugosa; negli organi legnosi più vecchi si sfalda in sottili strisce longitudinali; altezza che varia da 1÷8 m..

Il corbezzolo è elemento stenomediterraneo, specie termofila, caratteristica della macchia mediterranea, ove costituisce complessi puri o vive in consorzio con altri elementi termofili, così nelle macchie a Mirto, Alloro, Leccio, Lentisco e Sughera; con vasto areale che va dalla Penisola Iberica e dall'Africa sino al Mar Nero.

Viburnum tinus *L.* – Viburno

Pianta con portamento arbustivo o arboreo, eretta, glabra, alta fino a (1)2 – 4 (5) m, ramificata sin dalla base; corteccia verde- brunastro, provvista di lenticelle verticali, rugosa e lievemente angolosa.
Diffuso ai margini di boschi di latifoglie (es. Q. ilex), comune nella macchia mediterranea, da 0 a 800 m slm.
Nella macchia mediterranea forma consorzi, in base alla latitudine, con: *Quercus ilex*, *Phillyrea angustifolia o latifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*, *Arbutus unedo*, *Myrtus communis*, *Juniperus phoenicea o oxycedrus*, *Erica arborea*, *Laurus nobilis* ecc.
E' pianta ad elevata rusticità perchè in grado di adattarsi anche in ambienti con elevata siccità estiva.

Vitex agnus – castus *L.* – Agnocasto

Piccolo arbusto deciduo, alto 1-4(5) m, con forte odore resinoso-aromatico; portamento eretto a fusti flessibili, ramificati fin dalla base con vigorosi rigetti; rami giovani a sezione subquadrangolare con peli generalmente curvati, antrorsi.
Specie mediterranea litoranea termo-eliofila con gravitazione orientale e che si associa all'Oleandro, al Mirto e alle Tamerici.

Pistacia lentiscus *L.* – Lentisco

Pianta sempreverde a portamento arbustivo alto 1 –3 m, raramente arboreo alto 6–8 m, con accentuato odore di resina; chioma generalmente densa per la fitta ramificazione, di forma globosa, con rami a portamento tendenzialmente orizzontale; corteccia squamosa di colore cenerino nei giovani rami e bruno–rossastro nel tronco; legno di colore roseo. Foglie alterne, paripennate, glabre, di colore verde cupo.
È una pianta eliofila, termofila e xerofila che vegeta dal livello del mare fino a 600 metri. Tipico componente della macchia mediterranea sempreverde spesso in associazione con l'olivastro, la fillirea e il mirto; molto adattabile per il terreno, predilige però suoli silicei. Non è specie colonizzatrice ma può assumere aspetto dominante nelle fasi di degradazione della macchia, in particolare dopo ripetuti incendi.

Teucrium fruticans “azureum” *L.* – Camedrio fruticoso

Frutice perenne, sempreverde, alto 50-150 (200) cm, con fusti fogliosi, pelosi, erbacei e quadrangolari da giovani, poi legnosi , glabri e rotondeggianti, di colore cinerino, molto ramificati, che gli conferiscono un aspetto cespuglioso.
Vegeta anche su substrati calcarei e nelle boscaglie sempreverdi nei pressi del mare da 0 a 600 m.

Euryops pectinatus *L.* –

Arbusto sudafricano sempreverde con foglie frastagliate, portamento eretto, dotato d'infiorescenze gialle simili a margherite; fioritura estivo-autunnale .
L'altezza può arrivare a 1-1,50 m.
Viene utilizzato in giardino come bordura, nelle aiuole o in vaso (diametro minimo 30 cm).
Richiede terreno fertile, leggero, e ben drenato, teme i ristagni soprattutto in inverno, oltre che ambienti ben soleggiati nei mesi caldi.

Santolina chamaecyparissus *L.* – Santolina

La Santolina chamaecyparissus è un piccolo arbusto sempreverde originario dell'Europa mediterranea; le piante di alcuni anni possono raggiungere i 50-60 cm di altezza, espandendosi per 80-90 cm in larghezza. Ha portamento eretto o semi-prostrato, e costituisce densi arbusti tondeggianti, costituiti da sottili fusti legnosi ricoperti da foglie molto divise, composte da piccoli lobi lineari, di colore grigio-verde, dall'aspetto lanoso, intensamente profumati.

Euphorbia characias “Wulfenii” *L.* – Euforbia a cespi

E’una perenne sempreverde, cespuglio bello e importante, facile, fogliame grande verde-ceruleo ama il terreno fresco come esposizione preferisce Sole il fiore è giallo appartiene alla famiglia delle Euphorbiaceae il suo periodo di fioritura è Maggio – Luglio raggiunge un'altezza massima di 100 cm – 120 Pianta della regione mediterranea e della costa portoghese. Vegeta nelle macchie, garighe, terreni incolti e aperti, aridi e soleggiati fino a 1000 m.

Duranta ellisia *L.* – Camedrio fruticoso

La Duranta è originaria dell'America centrale è sempreverde nelle zone con clima invernale mite; dalla primavera inoltrata fino all'autunno all'apice dei fusti sbocciano piccoli fiori di colore viola o blu, a cinque petali, con margine bianco e occhio chiaro, riuniti in lunghe pannocchie pendule. In autunno i fiori che seguono è piccole bacche dorate, che spesso persistono sulla pianta per settimane.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- http://www.floraitaliae.actaplantarum.org

- BANFI E. CONSOLINO F. 2008. Alberi. Istituto Geografico De Agostini Novara.

- TUTIN T.G. et al., 1964-1980. Flora Europaea, Cambridge University Press

- PIGNATTI S., 1982. Flora d'Italia, Edagricole, Bologna